

3

باب

ٹریگنومیٹرک تفactualات (TRIGONOMETRIC FUNCTIONS)

❖ ایک ریاضی دان جانتا ہے کہ مسئلہ کا حل کس طرح

❖ کیا جاتا ہے، وہ اسے کرنہیں سکتا۔ "MILNE"

3.1 تعارف (Introduction)




آریہ بھٹ
(476-550)

لفظ ٹریگنومیٹری۔ گریک الفاظ "trigon" اور "metron" سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے مثلث کے اضلاع کی پیمائش کرنا ابتداء میں مضمون مثلثوں کے چیزوں کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا مطالعہ جہاز رانی کے سمندری کے کپتانوں، نئی زینوں کے نقشے بنانے والے سرویزor surveyor اور انجینئرز میں engineers وغیرہ کر پکے تھے۔ آج کل ٹریگنومیٹری کا استعمال بہت سے حلقوں میں کیا جاتا ہے جیسے زلزلہ کی وجوہات جاننے، بر قی سرکٹ کے ڈیزائن بنانے، ایم کی حالت کو بتانے، سمندر میں الہوں کی اوپرچاری کی پیش گوئی کرنے، موسیقی کی ڈھن کو الگ الگ بتانے اور بہت سی دوسری جگہ کیا جاتا ہے۔

ہم بچپلی جماعتوں میں پہلے ہی زاویہ حادہ کی ٹریگنومیٹرک نسبتوں بحیثیت قائم زاوی مثلث (right angled triangle) کے ضلعوں کے نسبت کی حیثیت سے پڑھ کچے ہیں، ہم پہلے ہی ٹریگنومیٹرک اکائی اور ان کا استعمال ان مسئللوں کے حل کے لیے کر پکے ہیں جن میں اوپرچاری اور فاصلہ پر منی سوالات ہوں۔ اس سبق میں ہم ٹریگنومیٹرک نسبتوں کے مفہوم کو عام کر کے ٹریگنومیٹرک تفactualات اور اس کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔


3.2 زاویے (Angles)

کسی شعاع (Ray) کی نقطہ آغاز کے گرد گھومنے کی مقدار زاویہ (Angle) کہلاتی ہے۔ اصلی شعاع زاویہ کا ابتدائی ضلع (Initial arm)



شکل 3.1

اور گھونٹ کے بعد کی حالت میں وہ شعاع زاویہ کا اختتامی ضلع کھلاتا ہے جس نقطہ کے گرد گھماو ہوا ہے اسے نقطہ راس (Vertex) کہتے ہیں۔ اگر گھونٹ کی سمت anti-clock wise ہو تو زاویہ ثابت زاویہ کھلاتا ہے اور اگر گھونٹ کی سمت clock wise ہو تو زاویہ منفی ہو گا۔



شکل 3.2


تک گھونٹ سے حاصل ہوتا ہے زاویوں کو ناپنے کے بہت سے پیانے ہیں۔ زاویہ کی تعریف ایک اکائی بتاتی ہے۔ جس کا مطلب ہے ابتدائی ضلع کی جگہ سے ایک مکمل چکر جیسا کہ شکل 3.2 میں دکھایا گیا۔

عام طور پر یہ بڑے زاویوں کے لیے (موزوں) ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہیہ تیزی سے گھومتا ہوا 15 چکرنی سینڈ کے حساب سے ایک زاویہ بناتا ہے۔ ہمیں زاویہ کی پیمائش کی دو اکائیاں بتانی ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں مطلب ہے درجہ پیمائش (Degree measure) اور ریڈین پیمائش (radian measure)۔

3.2.1 درجہ پیمائش (Degree measure) اگر گھماو یا گردش ابتدائی ضلع سے اختتامی ضلع تک چکر $\left(\frac{1}{360}\right)^{\text{th}}$ کے تھوڑے بڑے زاویوں کی پیمائش 1 درجہ ہے جو 1° لکھا جاتا ہے۔ ایک درجہ منٹوں میں بانٹا جاتا ہے اور ایک منٹ سینڈوں میں بانٹا جاتا ہے۔ درجہ کا ایک ساٹھواں حصہ منٹ کھلاتا ہے اور ایک منٹ کا ایک ساٹھواں حصہ ایک سینڈ کھلاتا ہے اور "1" لکھا جاتا ہے۔

$$1^{\circ} = 60' , \quad 1' = 60''$$


کچھ زاویے جن کی ماقبل (ناپ) $360^{\circ}, 270^{\circ}, 180^{\circ}, 420^{\circ}, -30^{\circ}, -420^{\circ}$ میں دکھائے گئے ہیں۔




شکل 3.3

3.2.2 ریڈین پیمائش (Radian measure) (زاویہ کی پیمائش کی ایک دوسری اکائی ریڈین پیمائش ہے۔ ایک اکائی کی لمبائی والے توں سے مرکز پر جو زاویہ بنتا ہے جسکو ایک اکائی دائرہ (وہ دائرہ جس کا نصف قطر اکائی ہے) کہتے ہیں جسکی پیمائش 1 ریڈین ہے۔ شکل میں (i) $Oa-3.4-Ob$ ابتدائی ضلع ہے اور OB اختتامی ضلع ہے یہ شکلیں وہ زاویہ دکھائی ہیں جنکی پیمائش (ناپ) ریڈین، ریڈین، ریڈین اور $\frac{1}{2}$ ریڈین اور $\frac{1}{2}$ ریڈین ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ اکائی نصف قطر والے دائرہ کا محیط 2π ہے۔ اسلئے ابتدائی ضلع کا ایک مکمل چکر 2π ریڈین کا زاویہ بناتا ہے۔



شکل (iii) سے (i) 3.4




شکل 3.4(iv)

اور زیادہ عام طور پر۔ نصف قطر والے دائرہ میں، لمبائی ولاقوس 1 ریڈین کا زاویہ بناتا ہے۔ یہ بخوبی جانا جاتا ہے کہ دائرہ کے برابرے قوس مرکز پر برابر کے زاویہ بناتے ہیں۔ کیونکہ نصف قطر والے دائرہ میں، ایک قوس جسکی لمبائی r ہے ایک زاویہ بناتی ہے جسکی پیمائش 1 ریڈین ہے، اس لیے ایک قوس جسکی لمبائی l ہے ایک زاویہ بنائے گا جسکی پیمائش $\frac{l}{r}$ ریڈین ہے۔ اس لے اگر ایک نصف قطر والے دائرہ میں، ایک قوس جسکی لمبائی l ہے مرکز پر ایک زاویہ θ بناتا ہے تو ہمارے پاس ہے۔

$$l = r\theta \quad \text{یا} \quad \theta = \frac{l}{r}$$

3.2.3 ریڈین اور حقیقی اعداد کے بیچ میں رشتہ (تعلق) (Relation between radian and real numbers)



3.2.4 درجہ اور ریڈین کے درمیان تعلق (رشتہ) (Relation between degree and radian) کیونکہ دائرہ مرکز پر ایک زاویہ بناتا ہے جسکی ریڈین پیمائش 2π ہے اور اس کی درجہ پیمائش 360° ہے۔ اس سے یہ ملتا ہے۔

$$2\pi \text{ radian} = 360^\circ$$

$$\pi \text{ radian} = 180^\circ$$

اوپر دیا ہوا رشتہ ہمیں ریڈین پیمائش میں طاہر کرنے میں مدد کرتا ہے اور درجہ پیمائش کو ریڈین پیمائش میں۔ π کی تقریباً اندر $\frac{22}{7}$ استعمال کرنے پر ہمارے پاس ہے

$$1 \text{ radian} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radian} = 0.01746 \text{ radian}$$

پچھے زاویوں کا درجہ پیمائش اور ریڈین پیمائش کے چھ رشتہ مندرجہ ذیل جدول میں دیا گیا ہے۔

Degree	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radian	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

خیالی معابدہ (سمجھوتہ) National convention

کیونکہ زاویے درجہ باریڈین میں ناپے جاتے ہیں، ہم خیالی معابدہ کو اپناتے ہیں کہ جب بھی ہم زاویہ θ° لکھیں۔ ہمارا مطلب ہے وہ زاویہ جسکی پیمائش θ ہے اور جب کبھی ہم زاویہ β لکھیں، ہمارا مطلب ہو وہ زاویہ جسکی ریڈین پیمائش β ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے جب کوئی زاویہ ریڈین میں طاہر کیا جائے۔ لفظ ریڈین کو زیادہ تر ہشادیں۔ اس لیے $180^\circ = \pi$ اور

$$\frac{\pi}{4} = 45^\circ \text{ اس سمجھ کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ } \pi \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین پیمائش میں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ }$$

$$\text{ریڈین پیمائش} = \frac{\pi}{180} \times \text{درجہ پیمائش}$$

$$\text{درجہ پیمائش} = \frac{180}{\pi} \times \text{ریڈین پیمائش}$$

مثال 1 $40^\circ 20'$ کو ریڈین پیمائش میں بدلتے۔

حل ہم جانتے ہیں کہ $\pi = 180^\circ$ ریڈین

$$\text{یہاں } \frac{121\pi}{540} = \frac{\pi}{180} \times \frac{121}{3} = 40^{\circ} 20' \text{ ریڈین}$$

$$\text{اس لئے } 40^{\circ} 20' = \frac{121\pi}{540} \text{ ریڈین}$$

مثال 2 6 ریڈین کو درجہ پیکاش میں بدلئے۔

حل ہم جانتے ہیں کہ $\pi \text{ ریڈین} = 180^{\circ}$

$$\text{اس لئے } 6 \text{ ریڈین} = \frac{1080 \times 7}{22} = \frac{180}{\pi} \text{ درجہ}$$

$$(1^{\circ} = 60' \text{ کیونکہ } 1^{\circ} = 60 \text{ منٹ}) 343^{\circ} = \frac{7 \times 60}{11} = 343 \frac{7}{11} \text{ درجہ}$$

$$(1^{\circ} = 60'' \text{ کیونکہ } 1^{\circ} = 60 \text{ منٹ}) 343^{\circ} + 38' + \frac{2}{11} =$$

$$343^{\circ} 38' 11'' = 343^{\circ} + 38' + 10.9'' =$$

$$\text{اس لئے } 6 \text{ ریڈین} = 343^{\circ} 38' 11'' \text{ (تقریباً)}$$

مثال 3 دائرة کا نصف قطر معلوم کیجئے جس میں 60° کا مرکزی زاویہ ایک قوس کو کھلائے ہے جس کی لمبائی 37.4 سم ہے

$$\left(\frac{22}{7} \pi \text{ کا استعمال کریں} \right)$$

$$\text{حل} \text{ یہاں } l = 37.4 \text{ اور } \frac{\pi}{3} = \frac{60\pi}{180} = 60^{\circ} = \theta \text{ ریڈین}$$

$$\text{اس طرح } r = \frac{l}{\theta} = \frac{37.4}{60^{\circ}} = \frac{37.4 \times 3}{180} = \frac{37.4 \times 3 \times 7}{22} = 35.7 \text{ سم}$$

مثال 4 ایک گھٹری کی منٹ والی سوتی کی لمبائی 1.5 سم ہے۔ یہ 40 منٹ میں کتنا آگے بڑھے گی؟ $\pi = 3.14$ کا استعمال کیجئے۔

حل 60 منٹ میں، منٹ والی سوتی گھٹری کا ایک چکر لگائی ہے۔ اس لیے 40 منٹ میں منٹ والی سوتی $\frac{2}{3}$ چکر لگائے گی۔

اس لیے 180° یا $\theta = \frac{2}{3} \times 360^\circ$ ریڈین بھائی طے کیا گیا۔

$$\text{فاصلہ } l = r\theta = 1.5 \times \frac{4\pi}{3} = 6.28 \text{ سم}$$

مثال 5 اگر دو برابر لمبائی والے قوس دائرہ کے مرکز پر بالترتیب 65° اور 110° کے زاویہ بناتے ہیں تو انکے نصف قطروں کی نسبت معلوم کیجئے۔

حل مان لیجئے r_1 اور r_2 دو دائروں کے نصف قطر ہیں۔ دیا ہوا ہے

$$\theta_1 = 65^\circ = \frac{\pi}{180} \times 65 = \frac{13\pi}{36}$$

$$\theta_2 = 110^\circ = \frac{\pi}{180} \times 110 = \frac{22\pi}{36}$$

مان لیجئے ہر قوس کی لمبائی l ہے، تب $l = r_1\theta_1 = r_2\theta_2$ جو دیتا ہے

$$\frac{13\pi}{36} \times r_1 = \frac{22\pi}{36} \times r_2, \text{ i.e., } \frac{r_1}{r_2} = \frac{22}{13}$$

$$r_1 : r_2 = 22 : 13 \quad \text{اس لیے}$$

مشتمل

13.1

.1 ذیل میں دی گئی درجہ پیمائش کے مطابق ریڈین پیمائش معلوم کیجئے۔

$$520^\circ \text{ (iv)} \quad 240^\circ \text{ (iii)} \quad -47^\circ 30' \text{ (ii)} \quad 25^\circ \text{ (i)}$$

.2 ذیل میں دی گئی ریڈین پیمائش کے مطابق درجہ پیمائش معلوم کیجئے۔ ($\frac{22}{7}\pi$ کا استعمال کیجئے)

$$\frac{7\pi}{6} \text{ (iv)} \quad \frac{5\pi}{3} \text{ (iii)} \quad -4 \text{ (ii)} \quad \frac{11}{16} \text{ (i)}$$

.3 ایک پہیا ایک منٹ میں 360° پچھلگاتا ہے۔ ایک سینٹنڈ میں یہ کتنے ریڈین گھومتا ہے؟

.4 ایک قوس جسکی لمبائی 22 سم ہے ایک دائرہ کے مرکزی پر جس کا نصف قطر 100 سم ہے زاویہ بناتا ہے اسکی درجہ پیمائش معلوم کیجئے۔

$$\left(\frac{22}{7}\pi \right) \text{ کا استعمال کیجئے}$$

.5 ایک 40 سم قطر والے دائرہ میں دتر کی لمبائی 20 سم ہے۔ وتر کے چھوٹے قوس کی لمبائی معلوم کیجئے؟

6. اگر دو دائروں میں برابر لمبائی والے قوس مرکز پر 60° اور 75° کے زاویہ بناتے ہیں تو ان کے نصف قطر کی نسبت معلوم کیجئے۔


7. ایک 75 سم لمبا پنڈول (لٹگر) جھول رہا ہے۔ اسکا سر اذیل لمبائی والے قوس بناتا ہے۔

(i) 10 سم (ii) 15 سم (iii) 21 سم

ریڈین میں ان زاویوں کی پیمائش معلوم کیجئے؟

3.3 ٹریگونومیٹریک تفactualات (Trigonometric Functions)

چھپلی جماعتوں میں حادہ زاویوں کی ٹریگونومیٹری نسبتیں قائمی زاوی مثلاً (Right angle triangle) کے اضلاع کی نسبتوں کی حیثیت سے پڑھ چکے ہیں اب ہم ٹریگونومیٹری نسبت کی تعریف کو کسی بھی زاویے کی ریڈین پیمائش تک بڑھا کر ٹریگونومیٹری تفactualات کی حیثیت سے مطالعہ کریں گے۔



اس لیے اکائی دائرة پر ہر نقطے کے لیے۔ ہمارے پاس ہے۔

$$a^2 + b^2 = 1$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

کیونکہ ایک پورا چکر مرکز پر 2π ریڈین کا زاویہ بناتا ہے،

زاویے جو $\frac{\pi}{2}$ کے مضبوط (Multiples) میں رجی زاویے (Quadrantal angles) کھلاتے ہیں۔ تفاضل A, B, C اور D کے مختص باتر ترتیب (0,1), (1,0), (-1,0) اور (0,-1) ہیں۔ اس لیے

$$\cos 0^\circ = 1 \quad \sin 0^\circ = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\cos \pi = -1 \quad \sin \pi = 0$$

$$\cos \frac{3\pi}{2} = 0 \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1$$

$$\cos 2\pi = 1 \quad \sin 2\pi = 0$$

اگراب ہم نقط P سے ایک مکمل چکر لیں، ہم دوبارہ پھر اسی نقط P پر آجائیں گے۔ اس لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بڑھتا ہے (یا گھٹتا ہے) 2π کے تکمیلہ ضریب سے تو sine اور cosine تفاضل کی قدر نہیں بدلتی۔ اس لیے

$$\cos(2n\pi + x) = \cos x, n \in \mathbf{Z}, \sin(2n\pi + x) = \sin x, n \in \mathbf{Z}$$

$$\sin x = 0, \text{ if } x = \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \dots \text{i.e., } \text{آگے}$$

جب x ایک π کا تکمیلہ ضریب ہو۔

$$\cos x = 0, \text{ if } x = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \pm \frac{5\pi}{2}, \dots \text{i.e., اور}$$

اس کا مطلب $\cos x$ ختم ہوتا ہے جبکہ x, $\frac{\pi}{2}$ کا طاقت ضریب ہو۔ اس لیے

$$\sin x = 0 \text{ implies } x = np, \text{ } n \text{ is any integer}$$

$$\cos x = 0 \text{ implies } x = (2n+1)\frac{\pi}{2}, \text{ } n \text{ is any integer}$$

اب ہم دوسرے ٹریگونومیٹریک تفاضل sine اور cosine تفاضل کی شکل میں بیان کریں گے۔
(n ایک صحیح عدد ہے)

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}, x \neq n\pi, \text{ } n \text{ is integer}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, \text{ } n \text{ is integer}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \text{ is integer}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, x \neq n\pi, n \text{ is integer}$$

ہم تمام حقیقی x کے لیے یہ دکھاچکے ہیں

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

اس سے یہ ملتا ہے۔

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$$


ہم اپنی کچھ جماعتوں میں ٹرگنومیٹری نسبت کی قدریں $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ اور 90° کے بارے میں بحث و مباحثہ کرچکے ہیں۔ ٹرگنومیٹری تفاضل کی قدریں ان زاویوں کے لیے وہی ہیں جو ٹرگنومیٹری نسبت کی کچھ جماعتوں میں پڑھی میں۔ اس لیے ہمارے پاس مندرجہ ذیل جدول ہے:

	0°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	not defined	0	not defined	0

کی قدریں $\cos x, \sin x$ اور $\tan x$ کے باترتیب مقلوب ہیں۔

3.3.1 ٹرگنومیٹری تفاضل کے نشانات (Signs of trigonometric functions)

اکائی دائرہ پر جس کا مرکز مبدہ پر ہے کوئی نقطہ ہے تاکہ $\angle AOP = x$ اگر $\angle AOQ = -x$ ہو تو نقطہ Q کے مختص (a, -b) ہوں گے (شکل 3.7)۔ اس لیے



$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

کیونکہ کسی بھی اکائی دائرہ پر نقطہ (a, b) کے لیے
 $-1 \leq b \leq 1$ اور $-1 \leq a \leq 1$
 اور $-1 \leq \sin x \leq 1$ تمام x کے لئے۔ ہم اپنی کچھی
 جماعتوں سے جانتے ہیں کہ پہلے ربع میں
 $\sin x > 0$ اور دوسرے ربع میں $\sin x < 0$
 اور $0 < x < \frac{\pi}{2}$ میں $\sin x$ مثبت ہے اور $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ میں $\sin x$ منفی ہے اور $\tan x$ مثبت ہے۔

ربيع میں ($\frac{\pi}{2} < x < \pi$) اور دوسرے ربع میں ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) مثبت ہے اور $\cos x$ منفی ہے اور $\sec x$ مثبت ہے۔ اس

لیے $0 < x < \pi$ کے لیے مثبت ہے اور $\sin x < 0$ کے لیے منفی (اسی طرح) مشابہ کے طور پر
 $\cos x < 0$ کے لیے منفی اور $\sec x < 0$ کے لیے مثبت ہے اور $\tan x < 0$ کے لیے منفی اور $\cot x < 0$ کے لیے مثبت ہے۔ اسی طرح

ہم دوسرے ٹریگونومیٹریک تفاضل کے لیے نشانات نکال سکتے ہیں مختلف ربعات میں۔ حقیقت میں ہمارے پاس مندرجہ ذیل جدول موجود ہے:

	I	II	III	IV
$\sin x$	+	+	-	-
$\cos x$	+	-	-	+
$\tan x$	+	-	+	-
$\cosec x$	+	+	-	-
$\sec x$	+	-	-	+
$\cot x$	+	-	+	-

3.2.2 ٹریگونومیٹریک تفاضلات کا علاقہ اور وسعت (Domain and range of trigonometri functionssine) اور cosine تفاضلات کی تعریف سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ حقیقی اعداد کے لیے دکھائے گئے ہیں اسکے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تمام حقیقی اعداد x کے لیے،

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \quad \text{اور} \quad -1 \leq \sin x \leq 1$$

اس لیے y کا علاقہ تمام حقیقی اعداد کا سیٹ ہے اور اسکی وسعت ایک وقفہ $[-1, 1]$ ہے۔ یعنی

$$-1 \leq y \leq 1$$

کیونکہ $\cosecx = \frac{1}{\sin x}$ اور $\sec x$ کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R}, x \neq n\pi, n \in \mathbf{Z}\}$ جو سیٹ ہے

اور وسعت ایک سیٹ ہے $(y : y \in \mathbf{R}, y \leq -1) \cup (y \geq 1)$ یا $(y : y \in \mathbf{R}, y \leq -1) \cup (y \geq 1)$ اسی طرح y کا علاقہ $\tan x$ کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R} \text{ and } x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{Z}\}$ جو ایک سیٹ ہے

اور وسعت ایک سیٹ ہے $\left\{x : x \in \mathbf{R} \text{ and } x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{Z}\right\}$ یا

جو کہ ایک سیٹ ہے $(y : y \in \mathbf{R}, y \leq -1)$

جو $\cot x$ کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R} \text{ and } x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{Z}\}$ اور وسعت تمام حقیقی اعداد کا سیٹ ہے۔ y کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R} \text{ and } x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{Z}\}$

ایک سیٹ ہے $\{x : x \in \mathbf{R} \text{ and } x \neq n\pi, n \in \mathbf{Z}\}$ اسکی وسعت تمام حقیقی اعداد کا سیٹ ہے۔

مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ربع میں جیسے x سے $\sin x$ سے 0 بڑھتا ہے۔ 1 سے $\sin x$ کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R}, 0 < x < \frac{\pi}{2}\}$ جاتا ہے، جیسے x سے $\cos x$ سے 1 بڑھتا ہے۔ 0 سے $\cos x$ کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R}, 0 < x < \frac{\pi}{2}\}$ جاتا ہے۔

تیسرا ربع میں جیسے x سے $\sin x$ سے 0 بڑھتا ہے تو 0 سے 1 کی طرف گھٹتا ہے۔ 0 سے 1 کا علاقہ $\{x : x \in \mathbf{R}, \frac{\pi}{2} < x < \pi\}$ جاتا ہے۔ اور آخر میں جو تھریوں میں $\sin x$ سے 0 کی طرف بڑھتا ہے جبکہ x سے 2π تک بڑھتا ہے۔



	I quadrant	II quadrant	III quadrant	IV quadrant
sin	increases from 0 to 1	decreases from 1 to 0	decreases from 0 to -1	increases from -1 to 0
cos	decreased from 1 to 0	decreases from 0 to -1	increases from -1 to 0	increases from 0 to 1
tan	increases from 0 to ∞	increases from $-\infty$ to 0	increases from 0 to ∞	increases from $-\infty$ to 0
cot	decreases from ∞ to 0	decreases from 0 to $-\infty$	decreases from 0 to $-\infty$	decreases from 0 to ∞
sec	increases from 1 to ∞	increases from $-\infty$ to -1	decreases from -1 to ∞	decreases from ∞ to 1
cosec	decreases from ∞ to 1	increases from 1 to ∞	increases from $-\infty$ to -1	decreases from -1 to $-\infty$



اسی طرح ہم دوسرے ٹرگنومیٹرک تفاضلات کے روایہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں۔ درحقیقت ہمارے پاس مندرجہ ذیل جدول موجود ہے۔

ریمارک اور پڑیئے ہوئے جدول میں، اس طرح کا بیان کہ $\tan x$ کی طرف بڑھتا ہے (in finity) سے $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ کے لیے اور بڑی ثابت اختیاری

کے لیے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ $\tan x$ بڑھتا ہے جبکہ x بڑھتا ہے $0 < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے اور بڑی منفی ثابت اختیاری $x \in (-\infty, -1)$ کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ $\cos x$ کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ $\sec x \in (\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ کے لیے لکھتا ہے۔ علمتیں ∞ اور $-\infty$ سادہ پر کچھ تفاضلات اور تغیر کے روایہ کو خاص طور پر بتاتے ہیں۔

ہم پہلے ہی دیکھے ہیں کہ $\sin x$ اور $\cos x$ کی قدر یہ 2π وقفہ کے بعد ہرائی جاتی ہے۔ اس لیے $\cos x$ اور $\sec x$ کی قدر یہ 2π وقفہ کے بعد بھی ہرائی جائیں گی۔ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے $\tan x = \tan(\pi + x)$ اس لئے $\tan x$ کی قدر یہ π وقفہ کے بعد ہرائی جائیں گی کیونکہ $\cot x$ اور $\tan x$ کا مقلوب ہے اس کی قدر بھی وقفہ π کے بعد دہرائی جائے گی۔ اس جانکاری اور ٹرگنومیٹرک تفاضلات کے روایہ کا استعمال کر کے ہم ان تفاضلات کے گراف بناسکتے (کہنچ سکتے) ہیں۔ ان تفاضلات کے گراف نیچے دیئے گئے ہیں۔





مثال 6 اگر $\cos x = \frac{-3}{5}$ تیسرا ربع میں ہے، دوسرے پانچ (5) ٹریگونومیٹریک توابع کی قبیلیں معلوم کیجئے۔

$$\sec x = -\frac{5}{3} \quad \text{اور } \cos x = \frac{-3}{5}$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \quad \text{اب } \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \quad \text{یا}$$

$$\sin x = \pm \frac{4}{5} \quad \text{اس لیے}$$

کیونکہ x تیرے ربع میں موجود ہے۔ اس لیے

$$\sin x = -\frac{4}{5}$$

جو یہ بھی دیتا ہے

$$\cos ec x = -\frac{5}{4}$$

اس کے آگے، ہمارے پاس ہے

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{4}{3} \text{ اور } \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{3}{4}$$

مثال 7 اگر x دوسرے ربع میں واقع ہے، دوسرے پانچ تر ٹرگنومیٹرک تفاضلات کی قسمیں معلوم کیجئے۔

حل کیونکہ $\cot x = \frac{-5}{12}$ ہمارے پاس ہے۔

$$\tan x = \frac{-12}{5}$$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x \quad \text{اب}$$

$$= 1 + \frac{144}{25} = \frac{169}{25}$$

$$\sec x = \pm \frac{13}{5} \quad \text{اس لیے}$$

کیونکہ x دوسرے ربع میں واقع ہے۔ اس لیے $\sec x$ ممکنی ہوگا۔

$$\sec x = -\frac{13}{5} \quad \text{اس لیے}$$

آگے ہمارے پاس ہے

$$\sin x = \tan x \cdot \cos x = \left(-\frac{12}{5}\right) \times \left(\frac{-5}{13}\right) = \frac{12}{13}$$

$$\cos ec x = \frac{1}{\sin x} = \frac{13}{12} \quad \text{اور}$$

مثال 8 $\sin x \frac{31\pi}{3}$ کی قیمت (قدر) معلوم کیجئے۔

حل ہم جانتے ہیں کہ $\sin x$ کی قدر یہ 2π کے بعد ہرائی جاتی ہیں۔

$$\sin \frac{31\pi}{3} = \sin(10\pi + \frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

اس لیے

مثال 9 $\cos(-1710^\circ)$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

حل ہم جانتے ہیں کہ $\cos x$ کی قدر 2π یا 360° کے وقفے کے بعد ہرائی جاتی ہیں۔

$$\begin{aligned}\cos(-1710^\circ) &= \cos(-1710^\circ + 5 \times 360^\circ) \\ &= \cos(-1710^\circ + 1800^\circ) \\ &= \cos = 90^\circ = 0\end{aligned}$$

مشق 3.2

دوسرے پانچ ٹرگنومیٹرک تفactualات کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

$$\text{تیسرا ربع میں واقع ہے۔} \quad .1$$

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{دوسرے ربع میں واقع ہے۔} \quad .2$$

$$\sin x = \frac{3}{5}$$

$$\text{تیسرا ربع میں واقع ہے۔} \quad .3$$

$$\cot x = \frac{3}{4}$$

$$\text{چوتھے ربع میں واقع ہے۔} \quad .4$$

$$\sec x = \frac{13}{5}$$

$$\text{دوسرے ربع میں واقع ہے۔} \quad .5$$

$$\tan x = -\frac{5}{12}$$

ذیل میں دیے ٹرگنومیٹرک تفactualات کی قدر یہ معلوم کیجئے۔

$$\cos ec(-1410^\circ) \quad .7 \qquad \sin 765^\circ \quad .6$$

$$\sin(-\frac{11\pi}{3}) \quad .9 \qquad \tan \frac{19\pi}{3} \quad .8$$

$$\cot(-\frac{15\pi}{4}) \quad .10$$

3.4 دو زاویوں کے جوڑ اور فرق کے ٹریگونومیٹرک تفاضلات

(Trigonometric Functions of Sum and Difference of Two Angles)

اس حصہ (سکشن) میں ہم دو اعداد (زاویوں) کے جوڑ اور فرق اور ان سے متعلق جملتی (منی) عبارتوں کے لیے ٹریگونومیٹرک تفاضلات کے لیے عبارتیں نکالیں گے۔ اس بابت میں بنیادی تنبیجوں کو ٹریگونومیٹرک مماثلت کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھے چکے ہیں کہ۔

$$\sin(-x) = -\sin x \quad .1$$


$$\cos(-x) = \cos x \quad .2$$

اب ہم کچھ اور بتائیں گے:

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \quad .3$$

ایک اکائی دائرہ پر جس کا مرکز مبدأ پر واقع ہو۔ مان لیجئے زاویہ P_1OP_2 ، P_4OP_1 ، x ، y اور زاویہ P_4OP_2 ، P_4OP_3 ، P_2 ، P_1 ، P_3 ، $-y$ ہے اس ساتھ ہی مان لیجئے $(-y)$ زاویہ P_4OP_3 کے مختصیں ہوں گے۔

(شکل 3.14)



مثلاً P_1P_3 اور P_1P_4 پر خور کجھے۔ دونوں متماثل ہیں (کیوں؟)۔ اس لیے P_1P_3 اور P_2P_4 برابر ہیں۔ فاصلہ کافارمولہ (ضابط) استعمال کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 P_1P_3^2 &= [\cos x - \cos(-y)]^2 + [\sin x - \sin(-y)]^2 \\
 &= (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x + \sin y)^2 \\
 &= \cos^2 x + \cos^2 y - 2 \cos x \cos y + \sin^2 x + \sin^2 y + 2 \sin x \sin y \\
 P_1P_3 &= 2 - 2(\cos x \cos y - \sin x \sin y) \quad (\text{کیونکہ } \text{یہ چیز}) \\
 P_2P_4^2 &= [1 - \cos(x + y)]^2 + [0 - \sin(x + y)]^2 \\
 &= 1 - 2 \cos(x + y) + \cos^2(x + y) + \sin^2(x + y) \\
 &= 2 - 2 \cos(x + y) \\
 P_1P_3 = P_2P_4, \text{ we have } P_1P_3^2 &= P_2P_4^2 \quad \text{کیونکہ} \\
 2 - 2(\cos x \cos y - \sin x \sin y) &= 2 - 2 \cos(x + y) \quad \text{اس لیے} \\
 \cos(x + y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \quad \text{اس لیے} \\
 \cos(x - y) &= \cos x \cos y + \sin x \sin y \quad .4
 \end{aligned}$$

مما مثلت $3\sin y - \cos y$ - سے تبدیل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 \cos[(x + (-y))] &= \cos x \cos(-y) - \sin x \sin(-y) \\
 \cos(x - y) &= \cos x \cos y + \sin x \sin y
 \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad .5$$

اگر ہم x کی جگہ $\frac{\pi}{2}$ رکھیں اور y کی جگہ x اکائی (4) میں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\frac{\pi}{2} \cos x + \sin\frac{\pi}{2} \sin x = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \quad .6$$

مماٹت 5 استعمال کرنے پر ہمارے پاس ہے۔

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos\left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right] = \cos x \\ \sin(x + y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \end{aligned} \quad .7$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \sin(x + y) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (x + y)\right) = \cos\left((\frac{\pi}{2} - x) - y\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos y + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin y \\ &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \\ &= \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y \end{aligned} \quad .8$$

اگر ہم مماٹت 7 میں $y -$ کو y سے تبدیل کر دیں تو، ہمیں نتیجہ مل جاتا ہے۔

مماٹات 3, 4, 5 اور 8 میں x کی مناسب قدریں (قیمتیں) لینے پر ہم ذیل نتیجوں پر پہنچتے ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \\ \cos(\pi - x) = -\cos x & \sin(\pi - x) = \sin x \\ \cos(\pi + x) = -\cos x & \sin(\pi + x) = -\sin x \\ \cos(2\pi - x) = \cos x & \sin(2\pi - x) = -\sin x \end{array}$$

اور x کے نتیجوں سے ہم $\cos x$ اور $\sin x$ کے مشابہ نتائج نکال سکتے ہیں۔

اگر x, y اور $(x+y)$ میں سے کوئی سا بھی زاویہ $\frac{\pi}{2}$ کا طاق ضریب نہیں ہے، تو .10

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

کیونکہ x, y اور $(x+y)$ میں سے کوئی بھی $\frac{\pi}{2}$ کا طاق ضریب نہیں ہے۔ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ $\cos x, \cos y$ اور

$$\text{اے صفت نہیں ہیں۔ اب}$$

$$\tan(x+y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)}$$

$$= \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\cos x \cos y - \sin x \sin y}$$

شمارکنندہ اور نسبت نماں دونوں کو پر تقسیم کرنے پر

$$\tan(x+y) = \frac{\frac{\sin x \cos y}{\cos x \cos y} + \frac{\cos x \sin y}{\cos x \cos y}}{\frac{\sin x \cos y}{\cos x \cos y} - \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y}}$$

$$= \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

$$\tan(x-y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} .11$$

اگر ہم متماثل 10 میں y کو $-y$ سے تبدیل کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\tan(x-y) = \tan[x+(-y)]$$

$$= \frac{\tan x + \tan(-y)}{1 - \tan x \tan(-y)} = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

اگر کوئی بھی زاویہ $x, y, x+y$ کا ضریب نہیں ہے، تو .12

$$\cot(x+y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot y + \cot x}$$

کیونکہ $x, y, x+y$ میں سے کوئی بھی π کا ضریب نہیں ہے، ہم یہ نکالتے ہیں کہ $\sin x, \sin y, \sin(x+y)$ اور $\sin(x+y)$ غیر صفر

ہیں۔ اب

$$\cot(x+y) = \frac{\cos(x+y)}{\sin(x+y)}$$

$$= \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\sin x \cos y + \cos x \sin y}$$

شمارکنندہ اور نسبت نماں کو $\sin x \sin y$ سے تقسیم کرنے پر ہمارے پاس ہے

$$\cot(x+y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot y + \cot x}$$

$$\cot(x-y) = \frac{\cot x \cot y + 1}{\cot y - \cot x} \quad .13$$

اگر متماثل 12 میں ہم کی $y-y$ -رکھیں تو ہم نتیجہ پہنچ جاتے ہیں۔

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \text{ or } 2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x \quad .14$$

$$\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} \quad \text{سادھی}$$

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x} \end{aligned}$$

ہر ایک رکن کو $\cos^2 x$ سے تقسیم کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

ہم جانتے ہیں کہ y کی جگہ x رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1 \end{aligned}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \quad \text{دوبارہ}$$

$$= 1 - \sin^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} \quad .15$$

ہمارے پاس ہے۔

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

y کی جگہ x رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\sin 2x = \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^2 x + \sin^2 x} \quad \text{دوبارہ}$$

ہر کن کو $\cos^2 x$ سے تقسیم کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad .16$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

کی جگہ x رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad .17$$

ہمارے پاس ہے

$$\sin 3x = \sin(2x + x)$$

$$= \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x$$

$$= 2 \sin x \cos x \cos x + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x$$

$$= 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + \sin x - 2 \sin^3 x$$

$$= 2 \sin x - 2 \sin^3 x + \sin x - 2 \sin^3 x$$

$$= 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x \quad .18$$

ہمارے پاس ہے

$$\cos 3x = \cos(2x + x)$$

$$\begin{aligned}
 &= \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x \\
 &= (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \sin x \cos x \sin x \\
 &= (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \cos x (1 - \cos^2 x) \\
 &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x + 2 \cos^3 x \\
 &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x
 \end{aligned}$$

$$\tan 3x = \frac{3\tan x - \tan^3 x}{1 - 3\tan^2 x} .19$$

تین گھنے کا سارے پاسے

$$\begin{aligned}
 \tan 3x &= \tan(2x + x) \\
 &= \frac{\tan 2x + \tan x}{1 - 3 \tan 2x \tan x} = \frac{\frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} + \tan x}{1 - \frac{2 \tan x \tan x}{1 - \tan^2 x}} \\
 &= \frac{2 \tan x + \tan x - \tan^3 x}{1 - \tan^2 x - 2 \tan^2 x} = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}
 \end{aligned}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (i) .20$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \quad (ii)$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (iii)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \quad (iv)$$

میں کہ جانتے ہیں

$$(1) \dots \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$(2) \dots \cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y \quad \text{اور}$$

(1) اور (2) کو جمع کرنے اور گھٹانے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$(3) \dots \cos(x+y) + \cos(x-y) = 2 \cos x \cos y$$

$$(4) \dots \cos(x+y) - \cos(x-y) = -2 \sin x \sin y \quad \text{اور}$$

$$(5) \dots \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \text{اس کے لئے}$$

$$(6) \dots \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y \quad \text{اور}$$

(5) اور (6) جمع کرنے اور گھٹانے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$(7) \dots \sin(x+y) + \sin(x-y) = 2 \sin x \cos y$$

$$(8) \dots \sin(x+y) - \sin(x-y) = 2 \cos x \sin y$$

مان تجھے ہے اس لیے۔

$$y = \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right) \quad \text{اور} \quad x = \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right)$$

اور y کی قیمتیں (3), (4), (7), (8)، میں رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\cos \theta + \cos \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right)$$

$$\cos \theta - \cos \phi = -2 \sin \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right)$$

$$\sin \theta + \sin \phi = 2 \sin \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right)$$

$$\sin \theta - \sin \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right)$$

کیونکہ θ اور ϕ کی کوئی بھی حقیقی تدریں ہو سکتی ہیں اس لئے ہم θ کی جگہ x اور ϕ کی جگہ y لکھ سکتے ہیں۔

اس لیے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

مثال 10 مبتداً 20 میں دیئے گئے حصہ کے طور پر ہم نے مندرجہ ذیل نتیجہ ثابت کیے ہیں۔

$$2\cos x \cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y) \quad (\text{i}) .21$$

$$-2\sin x \sin y = \cos(x+y) - \cos(x-y) \quad (\text{ii})$$

$$2\sin x \cos y = \sin(x+y) + \sin(x-y) \quad (\text{iii})$$

$$2\cos x \sin y = \sin(x+y) - \sin(x-y) \quad (\text{iv})$$

مثال 10 ثابت کیجئے کہ

$$3\sin \frac{\pi}{6} \sec \frac{\pi}{3} - 4\sin \frac{5\pi}{6} \cot \frac{\pi}{4} = 1$$

حل ہمارے پاس ہے

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= 3\sin \frac{\pi}{6} \sec \frac{\pi}{3} - 4\sin \frac{5\pi}{6} \cot \frac{\pi}{4} \\ &= 3 \times \frac{1}{2} \times 2 - 4 \sin \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) \times 1 = 3 - 4 \sin \frac{\pi}{6} \\ &= 3 - 4 \times \frac{1}{2} = 1 = \text{R.H.S.} \end{aligned}$$

مثال 11 $\sin 15^\circ$ کی قدر معلوم کیجئے۔

حل ہمارے پاس ہے

$$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

مثال 12 $\frac{13\pi}{12}$ کی قدر معلوم کیجئے۔

حل ہمارے پاس ہے

$$\tan \frac{13\pi}{12} = \tan \left(\pi + \frac{\pi}{12} \right) = \tan \frac{\pi}{12} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$= \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \frac{\pi}{6}}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{6}} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = 2 - \sqrt{3}$$

مثال 13 ثابت کیجئے

$$\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{\tan x + \tan y}{\tan x - \tan y}$$

حل مارے پاس ہے

$$\text{L.H.S.} = \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\sin x \cos y - \cos x \sin y}$$

شمارکنندہ اور نسب نماں کو $\cos x \cos y$ سے تقسیم کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{\tan x + \tan y}{\tan x - \tan y}$$

مثال 14 ثابت کیجئے

$$\tan 3x \tan 2x \tan x = \tan 3x - \tan 2x - \tan x$$

حل ہم جانتے ہیں کہ $3x = 2x + x$

$$\tan 3x = \tan(2x + x) \quad \text{اس لیے،}$$

$$\tan 3x = \frac{\tan 2x + \tan x}{1 - \tan 2x \tan x} \quad \text{یا}$$

$$\tan 3x - \tan 2x - \tan x = \tan 2x + \tan x - \tan 2x - \tan x \quad \text{یا}$$

$$\tan 3x - \tan 2x - \tan x = \tan 3x \tan 2x \tan x \quad \text{یا}$$

$$\tan 3x \tan 2x \tan x = \tan 3x - \tan 2x - \tan x \quad \text{یا}$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{4} + x \right) + \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = \sqrt{2} \cos x \quad \text{مثال 15 ثابت کیجئے کر}$$

حل

اکلی(i) 20 استعمال کرنے پر ہمارے پاس ہے۔

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{\frac{\pi}{4} + x + \frac{\pi}{4} - x}{2}\right) \cos\left(\frac{\frac{\pi}{4} + x - (\frac{\pi}{4} - x)}{2}\right) \\ &= 2 \cos\frac{\pi}{4} \cos x = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x = \sqrt{2} \cos x = \text{R.H.S.} \end{aligned}$$

مثال 16 ثابت کیجئے کہ

اکلی(i) اور(iv) 20 استعمال کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

حل

$$\frac{2 \cos \frac{7x+5x}{2} \cos \frac{7x-5x}{2}}{2 \cos \frac{7x+5x}{2} \sin \frac{7x-5x}{2}} = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x = \text{R.H.S.}$$

مثال 17 ثابت کیجئے کہ

ہمارے پاس ہے

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= \frac{\sin 5x - 2 \sin 3x + \sin x}{\cos 5x - \cos x} = \frac{\sin 5x + \sin x - 2 \sin 3x}{\cos 5x - \cos x} \\ &= \frac{2 \sin 3x \cos 2x - 2 \sin 3x}{2 \sin 3x \sin 2x} = \frac{\sin 3x(\cos 2x - 1)}{\sin 3x \sin 2x} \\ &= \frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \tan x = \text{R.H.S.} \end{aligned}$$

مشن

ثابت کیجئے کہ:

$$\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{3} - \tan^2 \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2} .1$$

$$2 \sin^2 \frac{\pi}{6} + \csc^2 \frac{7\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2} \quad .2$$

$$\cot^2 \frac{\pi}{6} + \csc^2 \frac{5\pi}{6} + \tan^2 \frac{\pi}{6} = 6 \quad .3$$

$$2 \sin^2 \frac{3\pi}{4} + 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} + \sec^2 \frac{\pi}{3} = 10 \quad .4$$

قد معلوم ہے: .5

$$\tan 15^\circ \quad (\text{ii}) \quad \sin 75^\circ (\text{i})$$

مندرجہ میں کوئی ثابت نہیں: .6

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - y\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - y\right) = \sin(x + y)$$

$$\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = \left(\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}\right)^2 \quad .7$$

$$\frac{\cos(\pi + y) \cos(-x)}{\sin(\pi - x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \cot^2 x \quad .8$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cos(2\pi + x) \left[\cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi + x) \right] = 1 \quad .9$$

$$\sin(n+1)x \sin(n+2)x + \cos(n+1)x \cos(n+2)x = \cos x \quad .10$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4} + x\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) = -\sqrt{2} \sin x \quad .11$$

$$\sin^2 6x - \sin^2 4x = \sin 2x \sin 10x \quad .12$$

$$\cos^2 2x - \cos^2 6x = \sin 4x \sin 8x \quad .13$$

$$\sin 2x + 2 \sin 4x + \sin 6x = 4 \cos^2 x \sin 4x \quad .14$$

$$\cot 4x (\sin 5x + \sin 3x) = \cot x (\sin 5x - \sin 3x) \quad .15$$

$$\frac{\sin 5x + \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x} = \tan 4x \quad .17$$

$$\frac{\cos 9x - \cos 5x}{\sin 17x - \sin 3x} = -\frac{\sin 2x}{\cos 10x} \quad .16$$

$$\frac{\sin x + \sin 3x}{\cos x + \cos 3x} = \tan 2x \quad .19$$

$$\frac{\sin x - \sin y}{\cos x + \cos y} = \tan \frac{x-y}{2} \quad .18$$

$$\frac{\sin x - \sin 3x}{\sin^2 x - \cos^2 x} = 2 \sin x \quad .20$$

$$\frac{\cos 4x + \cos 3x + \cos 2x}{\sin 4x + \sin 3x + \sin 2x} = \cot 3x \quad .21$$

$$\cot x \cot 2x - \cot 2x \cot 3x - \cot 3x \cot x = 1 \quad .22$$

$$\cos 4x = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x \quad .24$$

$$\tan 4x = \frac{4 \tan x (1 - \tan^2 x)}{1 - 6 \tan^2 x + \tan^4 x} \quad .23$$

$$\cos 6x = 32 \cos^6 x - 48 \cos^4 x + 18 \cos^2 x - 1 \quad .25$$

3.5 ٹریگونومیٹری مساواتیں (Trigonometric Equations)

ایسی مساواتیں جن میں متغیر (variable) کے ٹریگونومیٹری تفاضلی شامل ہوں ٹریگونومیٹری بائی مساواتیں کہلاتی ہیں۔ اس سیکشن میں ہم اس طرح کی مساوات کا حل معلوم کریں گے۔ ہم پہلے ہی پڑھ پکے ہیں کہ $\sin x$ اور $\cos x$ کی قدریں وقفہ $\pi/2$ کے بعد دہرائی جاتی ہیں اور $\tan x$ کی قدر وقفہ π کے بعد دہرائی جاتی ہے۔ مساوات کے حل $0 \leq x < 2\pi$ کے لیے پرنسپل حل کہلاتے ہیں۔ جو عبارت صحیح عدد n پر مبنی ہوا ورثی ٹریگونومیٹری مساوات کے تمام حل دے اسے عمومی حل (general solution) کہتے ہیں ہم لفظ Z کا استعمال صحیح اعداد کے لیے کریں گے۔

مندرجہ ذیل مساواتیں ٹریگونومیٹری مساواتوں کو حل کرنے میں سوچا رثابت ہوں گی۔

مثال 18 مساوات $\sin x = \sqrt{\frac{3}{2}}$ کے پرنسپل حل معلوم کے لیے۔

حل ہم جانتے ہیں کہ $\sin \frac{2\pi}{3} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

اس لیے $x = \frac{2\pi}{3}$ اور $\frac{\pi}{3}$ اس مساوات کے پرنسپل حل ہیں۔

مثال 19 مساوات $\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ کے پرنسپل حل معلوم کیجئے۔

$$\tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\tan\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{اس لیے } \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{ہم جانتے ہیں کہ حل}$$

$$\tan\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\tan\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{اور}$$

$$\tan\frac{5\pi}{6} = \tan\frac{11\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{اس لیے}$$

$$\text{اس لیے } \frac{11\pi}{6} \text{ اور } \frac{5\pi}{6} \text{ پر پل حل ہیں۔}$$

اب ہم ٹرگنومیٹریائی مساواتوں کا عام حل معلوم کریں گے۔ ہم پہلے ہی دیکھے چکے ہیں کہ:

$$n \in \mathbf{Z} \text{ دیتا ہے } x = n\pi \text{ جہاں } \sin x = 0$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ دیتا ہے } x = (2n+1)\frac{\pi}{2} \text{ جہاں } \cos x = 0$$

اب ہم مندرجہ ذیل نتائج کو ثابت کریں گے۔

مسئلہ 1 کوئی بھی x اور y حقیقی اعداد کے لیے

$$\sin x = \sin y \text{ implies } x = n\pi + (-1)^n y, \text{ where } n \in \mathbf{Z}$$

اگر $\sin x = \sin y$ تب **ثبوت**

$$2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} = 0 \quad \text{یا} \quad \sin x - \sin y = 0$$

$$\sin \frac{x-y}{2} = 0 \quad \text{یا} \quad \cos \frac{x+y}{2} = 0 \quad \text{جود یاتا ہے}$$

$$\text{اس لیے } \frac{x+y}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \quad \text{یا} \quad \frac{x-y}{2} = n\pi \quad \text{جہاں } n \in \mathbf{Z}$$

$$x = 2(n\pi + y + 1)\pi - y \quad \text{یا} \quad x = 2n\pi + y \quad \text{جہاں } n \in \mathbf{Z}$$

$$\text{اس لیے } x = (2n+1)\pi + (-1)^{2n+1} y \quad \text{یا} \quad x = 2n\pi + (-1)^{2n} y \quad \text{جہاں } n \in \mathbf{Z}$$

ان دونوں نتائج کو ساتھ ملانے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = n\pi + (-1)^n y \quad \text{جہاں } n \in \mathbf{Z}$$

مسئلہ 2 کون ہی حقیقی اعداد x اور y کے لیے $\cos x = \cos y$ مطلب ہے جہاں $n \in \mathbf{Z}$

اگر $\cos x = \cos y$ تو **ثبت**

$$\cos x - \cos y = 0 \quad i.e. \quad -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} = 0$$

$$\sin \frac{x-y}{2} = 0 \quad \text{یا} \quad \sin \frac{x+y}{2} = 0 \quad \text{اس لیے}$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } \frac{x-y}{2} = n\pi \quad \text{یا} \quad \frac{x+y}{2} = n\pi \quad \text{اس لیے}$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = 2n\pi + y \quad \text{یا} \quad x = 2n\pi - y \quad \text{یعنی}$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = 2n\pi \pm y \quad \text{اس لیے}$$

مسئلہ 3 ثابت کیجئے کہ اگر x اور y کے ناطق ضریب نہیں ہیں تو $\tan x = \tan y$ کا مطلب ہے

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = 2n\pi \pm y$$

اگر $\tan x = \tan y$ تو **ثبت**

$$\tan x - \tan y = 0$$

$$\sin x \cos y - \cos x \sin y \quad \text{یعنی}$$

$$\text{جودیتا ہے } \sin(x-y) = 0 \quad (\text{کیونکہ } ?)$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = n\pi + y \quad \text{اسکا مطلب ہے } x - y = n\pi$$

$$\text{مثال 20} \quad \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{کا حل معلوم کیجئے۔}$$

$$\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} = -\sin \frac{\pi}{3} = \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{4\pi}{3} \quad \text{ہمارے پاس ہے} \quad \text{حل}$$

$$\text{اس لیے } \sin x = \sin \frac{4\pi}{3} \quad \text{جودیتا ہے۔}$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = n\pi + (-1)^n \frac{4\pi}{3}$$

نوت کی ایسی قدر جس کے لیے $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ کی ایک دوسری قدر بھی لی جاسکتی ہے جس کے لیے $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہو۔ اس طرح حاصل ہوئے حل یہاں ہوں گے جبکہ یہ دکھائی دینے میں الگ الگ ہیں۔

مثال 21 $\cos x = \frac{1}{2}$ کو حل کیجئے۔

حل ہمارے پاس ہے $\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$

اس لیے $n \in \mathbf{Z}$ جہاں $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

مثال 22 $\tan 2x = -\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ کو حل کیجئے۔

حل ہمارے پاس ہے $\tan 2x = -\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} + x + \frac{\pi}{3}\right)$

یا $\tan 2x = \tan\left(x + \frac{5\pi}{5}\right)$

اس لیے $n \in \mathbf{Z}$ جہاں $2x = n\pi + x + \frac{5\pi}{5}$

یا $n \in \mathbf{Z}$ جہاں $x = n\pi + \frac{5\pi}{5}$

مثال 23 $\sin 2x - \sin 4x + \sin 6x = 0$ کو حل کیجئے۔

حل مساوات کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے:

$\sin 6x + \sin 2x - \sin 4x = 0$ یا

$2\sin 4x \cos 2x - \sin 4x = 0$ یا

$\sin 4x(2\cos 2x - 1) = 0$ ie

$\cos 2x = \frac{1}{2}$ یا $\sin 4x = 0$ اس لیے

$$\cos 2x = \cos \frac{\pi}{3} \quad \text{یا} \quad \sin 4x = 0 \quad \text{ie}$$

$$n \in \mathbf{Z} \quad \text{جہاں} \quad x = n\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad \text{یا} \quad 4x = n\pi \quad \text{اس لیے}$$

$$n \in \mathbf{Z} \quad \text{جہاں} \quad x = n\pi \pm \frac{\pi}{4} \quad \text{یا} \quad x = \frac{n\pi}{4} \quad \text{ie}$$

مثال 24 $2\cos^2 x + 3\sin x = 0$ کو حل کیجئے۔

مساوات کو اس طرح بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$2(1 - \sin^2 x) + 3\sin x = 0$$

$$2\sin^2 x - 3\sin x - 2 = 0 \quad \text{یا}$$

$$(2\sin x + 1)(\sin x - 2) = 0 \quad \text{یا}$$

$$\sin x = 2 \quad \text{یا} \quad \sin x = -\frac{1}{2} \quad \text{اس لیے}$$

لیکن $\sin x = 2$ ممکن نہیں ہے (کیوں؟)

$$\sin x = -\frac{1}{2} = \sin \frac{7\pi}{6} \quad \text{اس لیے}$$

اس لیے حل اس طرح دیا گیا ہے۔

$$n \in \mathbf{Z} \quad \text{جہاں} \quad x = n\pi + (-1)^n \frac{7\pi}{6}$$

مشق 3.4

ذیل مساواتوں کے صدر (Principal) اور عمومی (General) حل معلوم کیجئے۔

$$\sec x = 2 \quad .2 \quad \tan x = \sqrt{3} \quad .1$$

$$\cos ex = -2 \quad .4 \quad \cot x = -\sqrt{3} \quad .3$$

ذیل میں دی گئی ہر ایک مساواتوں کے مجموعی حل معلوم کیجئے۔

$$\cos 3x + \cos x - \cos 2x = 0 \quad .6 \quad \cos 4x = \cos 2x \quad .5$$

$$\sec^2 2x = 1 - \tan 2x \quad .8 \quad \sin 2x + \cos x = 0 \quad .7$$

$$\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 0 \quad .9$$

متفرق مثالیں

مثال 25 اگر $\cos y = \frac{12}{13}$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ جہاں x اور y دونوں دوسرے ربع میں واقع ہیں (یعنی $\sin(x+y)$ کی قدر معلوم کیجئے۔

حل ہم جانتے ہیں کہ

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \quad \text{اب}$$

$$\cos x = 1 \pm \frac{4}{5} \quad \text{اس لیے}$$

کیونکہ x دوسرے ربع میں ہے اس لیے $\cos x$ منفی ہے۔

$$\cos x = -\frac{4}{5} \quad \text{اس لیے}$$

$$\sin^2 y = 1 - \cos^2 y = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169} \quad \text{اب}$$

$$\sin y = \pm \frac{5}{13} \quad \text{یعنی}$$

کیونکہ y دوسرے ربع میں موجود ہے، $\sin y$ مثبت ہے۔ اس لیے $\sin y = \frac{5}{13}$ اور $\cos y$ کی قیمتیں مساوات (i) میں

رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sin(x+y) = \frac{3}{5} \times \left(-\frac{12}{13}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right) \times \frac{5}{13} = \frac{36}{65} - \frac{20}{65} = -\frac{56}{65}$$

مثال 26 ثابت کیجئے کہ

$$\cos 2x \cos \frac{x}{2} - \cos 3x \cos \frac{9x}{2} = \sin x \sin \frac{5x}{2}$$

حل مارے پا سے۔

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \frac{1}{2} \left[2\cos 2x \cos \frac{x}{2} - 2\cos \frac{9x}{2} \cos 3x \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\cos \left(2x + \frac{x}{2} \right) - \cos \left(2x - \frac{x}{2} \right) - \cos \left(\frac{9x}{2} + 3x \right) - \cos \left(\frac{9x}{2} - 3x \right) \right] \\
 &\quad \left[\cos \frac{5x}{2} + \cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{15x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right] = \frac{1}{2} \left[\cos \frac{5x}{2} - \cos \frac{15x}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[-2 \sin \left\{ \frac{\frac{5x}{2} + \frac{15x}{2}}{2} \right\} \sin \left\{ \frac{\frac{5x}{2} - \frac{15x}{2}}{2} \right\} \right] \\
 &= -\sin 5x \sin \left(-\frac{5x}{2} \right) = \sin 5x \sin \frac{5x}{2} = \text{R.H.S}
 \end{aligned}$$

مثال 27 کی قیمت معلوم کیجئے۔

$$2X = \frac{\pi}{4} \quad X = \frac{\pi}{8}$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \text{اب}$$

$$\tan \frac{\pi}{4} = \frac{2 \tan \frac{\pi}{8}}{1 - \tan^2 \frac{\pi}{8}}$$

$$1 = \frac{2y}{1 - y^2} \quad y = \tan \frac{\pi}{8} \quad \text{مان بھیجیں}$$

$$y^2 + 2y - 1 = 0 \quad \text{یا}$$

$$y = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2} \quad \text{اس لیے}$$

$$\text{کیونکہ } \frac{\pi}{8} \text{ پہلے ربع میں موجود ہے اس لیے } y = \tan \frac{\pi}{8}$$

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1 \quad \text{اس لیے}$$

مثال 28 اگر $\tan \frac{x}{2}$ ، $\cos \frac{x}{2}$ ، $\sin \frac{x}{2}$ ، $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ ، $\tan x = \frac{3}{4}$ کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

کیونکہ $\cos x$ ، $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ منفی ہے۔

$$\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \frac{3\pi}{2} \quad \text{ساتھی}$$

اس لیے $\cos \frac{x}{2}$ بھی ثابت ہو گا اور $\sin \frac{x}{2}$ منفی ہے

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} \quad \text{اب}$$

$$\cos x = -\frac{4}{5} \quad \text{یا} \quad \cos^2 x = \frac{16}{25} \quad \text{اس لیے}$$

$$2\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x = 1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5} \quad \text{اب}$$

$$2\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{9}{10} \quad \text{اس لیے}$$

$$\sin x = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad \text{یا} \quad (\text{کیونکہ}?)$$

$$2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5} \quad \text{دوجا رہ}$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{10} \quad \text{اس لیے}$$

$$\cos x = -\frac{1}{\sqrt{10}} \quad \text{یا} \quad \text{کیوں؟}$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \times \left(\frac{-\sqrt{10}}{1} \right) = -3 \quad \text{اس لیے}$$

$$\cos^2 x + \cos^2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + \cos^2 \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{3}{2} \quad \text{ثابت کیجئے کہ}$$

حل ہمارے پاس ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{L. H. S} &= \frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)}{2} + \frac{1 + \cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right)}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \left[3 + \cos 2x + \cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[3 + \cos 2x + 2\cos 2x \cos \frac{2\pi}{3} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[3 + \cos 2x + 2\cos 2x \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[3 + \cos 2x + 2\cos 2x \cos \frac{\pi}{3} \right] \\
 &= \frac{1}{2} [3 + \cos 2x + 2\cos 2x] = \frac{3}{2} \quad \text{R.H.S}
 \end{aligned}$$

مختصر مشق باب 3

ٹابت کچھ کہ:

$$2\cos \frac{\pi}{13} \cos \frac{9\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13} = 0 \quad .1$$

$$(\sin 3x + \sin x) \sin x + (\cos 3x - \cos x) \cos x = 0 \quad .2$$

$$(\cos x + \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 4 \cos^2 \frac{x+y}{2} \quad .3$$

$$(\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 4 \sin^2 \frac{x-y}{2} \quad .4$$

$$\sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x = 4 \cos x \cos 2x \sin 4x \quad .5$$

$$\frac{(\sin 7x + \sin 5x) + (\sin 9x + \sin 3x)}{(\cos 7x + \cos 5x) + (\cos 9x + \cos 3x)} = \tan 6x \quad .6$$

$$\sin 3x + \sin 2x - \sin x = 4 \sin x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} \quad .7$$

$\text{Tan} \frac{x}{2}$ اور $\text{Cos} \frac{x}{2}$, $\text{Sin} \frac{x}{2}$ کی قسمیں ذیل میں معلوم کیجئے۔

$$\text{دوسرے ربع میں } \text{Tan}x = -\frac{4}{3} \quad .8$$

$$\text{دوسرے ربع میں } \text{Cos}x = -\frac{1}{3} \quad .9$$

$$\text{دوسرے ربع میں } \text{Sin}x = \frac{1}{4} \quad .10$$

خلاصہ (Summary)

اگر ایک قوس جسکی لمبائی l ہے ایک دائرہ میں جو کا نصف قطر ہے θ ریڈین کا زاویہ بناتا ہے تو

$$\text{ریڈین پیمائش} \times \frac{\pi}{180} \quad \text{ڈگری پیمائش} \quad \diamond$$

$$\text{ڈگری پیمائش} \times \frac{\pi}{180} \quad \text{ریڈین پیمائش} \quad \diamond$$

$$\text{Cos}^2 x + \text{Sin}^2 x = 1 \quad \diamond$$

$$1 + \tan^2 x = \text{Sec}^2 x \quad \diamond$$

$$1 + \text{Cot}^2 x = \text{Co sec}^2 x \quad \diamond$$

$$\text{Cos}(2n\pi + x) = \text{Cos}x \quad \diamond$$

$$\text{Sin}(2n\pi + x) = \text{Sin}x \quad \diamond$$

$$\text{Sin}(-x) = -\text{Sin}x \quad \diamond$$

$$\text{Cos}(-x) = \text{Cos}x \quad \diamond$$

$$\text{Cos}(x + y) = \text{Cos}x \text{Cos}y - \text{Sin}x \text{Sin}y \quad \diamond$$

$$\text{Cos}(x - y) = \text{Cos}x \text{Cos}y + \text{Sin}x \text{Sin}y \quad \diamond$$

$$\text{Cos}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \text{Sin}x \quad \diamond$$

$$\text{Sin}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \text{Cos}x \quad \diamond$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = \cos x \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\sin x$$

$$\sin(\pi-x) = \sin x \quad \cos(\pi-x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi+x) = -\sin x \quad \cos(\pi+x) = -\cos x$$

$$\sin(2\pi-x) = -\sin x \quad \cos(2\pi-x) = \cos x$$

اگر کسی بھی زاویہ x اور y کے طاق ضرب نہیں ہیں، تو

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

$$\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

اگر کسی بھی زاویہ x اور y کے ضرب نہیں ہیں، تو

$$\cot(x+y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot y + \cot x}$$

$$\cot(x-y) = \frac{\cot x \cot y + 1}{\cot y - \cot x}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (\text{i}) \quad \blacklozenge$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \quad (\text{ii})$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (\text{iii})$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \quad (\text{iv})$$

$$2 \cos x \cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y) \quad (\text{i}) \quad \blacklozenge$$

$$-2 \sin x \sin y = \cos(x+y) - \cos(x-y) \quad (\text{ii})$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x+y) + \sin(x-y) \quad (\text{iii})$$

$$2 \cos x \sin y = \sin(x+y) - \sin(x-y) \quad (\text{iv})$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = n\pi \text{ دیتا ہے } \sin x = 0 \quad \blacklozenge$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = (2n+1)\frac{\pi}{2} \text{ دیتا ہے } \cos x = 0 \quad \blacklozenge$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = n\pi + (-1)^n y \text{ کامطلب ہے } \sin x = \sin y \quad \blacklozenge$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = 2n\pi \pm y \text{ کامطلب ہے } \cos x = \cos y \quad \blacklozenge$$

$$n \in \mathbf{Z} \text{ جہاں } x = 2n\pi + y \text{ کامطلب ہے } \tan x = \tan y \quad \blacklozenge$$

تاریخ کے اوراق سے

ٹرگونومیٹری کی تعلیم پہلے ہندوستان میں شروع ہوئی تھی۔ قدیمی ہندوستانی ریاضی دان آریہ بھٹ (476 AD) برہم گپتا (598 AD) بھاسکر (600 AD) اور بھاسکر IL (1114 AD) کو اہم منانج ملے۔ یہ تمام معلومات پہلے ہندوستان سے مدینہ ایشیا اور پھر وہاں سے یورپ کی طرف گئی۔ یونانی بھی ٹرگونومیٹری کی تعلیم شروع کر چکے تھے لیکن ان کا راستہ انڈری پن (بغیر سوچ سمجھے آگے بڑھنے) کا تھا کہ جب ہندوستانی کھوج سب کو معلوم ہوئی، تب ہی دنیا میں سب نے اسے اپنالیا۔

ہندوستان میں جدید ٹریگونومیٹریک تفاضل کا پیش رو جزو ایہ کے sine کہلاتے تھے اور Sine تفاضل (Sine function) کا آغاز اجرام فلکی کے لئے ایک عظیم دین ہے اور ریاضی کی تاریخ ہے۔
بھاسکر، (600AD) کے قریب (Formulas) نے سائنس تفاضل کی قسمیں معلوم کرنے کے لیے ضابطہ (Formulas) دیے جہاں زاویہ 90° سے زیادہ ہوں۔ سولھویں صدی میں Malayalam کام جو Yukti bhasa کہلاتا ہے میں (A+B)، sine کے پھیلاؤ کا ثبوت ہے۔ اور Cosines کی درست عبارت $18^{\circ}, 36^{\circ}, 54^{\circ}, 72^{\circ}$ وغیرہ بھاسکر II نے دی ہے۔

Sinx Cosx وغیرہ کے مابہر فلکیات Sir John F.W. تجویز کیں۔ Thales کا نام (600 B.C) کے قریب (مستقبل) (یکساں) طور پر اونچائی اور فاصلہ کے مسائل کے ساتھ جڑا ہے۔ اس بات کا شرف حاصل ہے اس نے مصر کے حرم (Pyramid) کی اونچائی حرم کے عکس کے اونچائی کی مدد سے معلوم کی جو ایک امدادی عملہ (Staf) جسکی اونچائی پہلے سے ہی معلوم تھی ان دونوں کی نسبت کا موازنہ کیا۔

$$\frac{H}{S} = \frac{h}{s} = \tan (\text{sun's attitude})$$

(سورج کی شعاعوں کا سطح سمندر سے زاویہ)
 $\tan =$
 کہا جاتا ہے کہ Thales نے ایک کشتی کا فاصلہ سطح سمندر پر نکالا تھا جو اس نے یکساں مثاثوں کے ضلعوں کی نسبت کا استعمال کر کے کیا۔ یکساں خصوصیت کا استعمال اونچائی اور فاصلہ کے مسئلہ پر قدیم ہندوستانی کاموں میں پایا جاتا ہے۔

